

**Aus der Universitätsklinik und Poliklinik
für Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten, Bonn**
Direktor: Professor Dr. med. Proell.

Rassenunterschiede und -merkmale bei Zähnen recenter Menschenrassen.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn.

✻

Vorgelegt am 12. Januar 1937.

von

Josef Eifel

Zahnarzt aus Bonn.

B O N N 1937.

Anton Brand, Bonn.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der
Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Proell.



*Dem Andenken meines verstorbenen Vaters
und meiner lieben Mutter gewidmet!*

Einleitung.

Es mag vielleicht manchem überflüssig erscheinen, heute noch eine Arbeit über Rassen Dinge mit der Erklärung des Begriffes Rasse zu beginnen. Gewiß, wir wissen heute, daß es keine „deutsche Rasse“, keine „englische“ und keine „französische“ gibt, daß Volksbezeichnungen keine Rassenamen sind, ebenso wenig wie Bezeichnungen für Kultur- oder Sprachverbände.

Trotzdem bringen viele Autoren in ihren Zusammenstellungen neben Rassebezeichnungen linguistische und ethnische Bezeichnungen, und viele Veröffentlichungen bedürfen hier einer Umarbeitung. Im Rahmen dieser Arbeit ist dies mir jedoch nicht möglich und ich bin daher gezwungen, bei Verarbeiten des betreffenden Materials in Aufzählungen neben Rassenamen auch Bezeichnungen für Volks- und Sprachgemeinschaften aufzuführen.

Mit dem Begriff Volk bezeichnet man eine Gemeinschaft von Menschen mit gleicher Kultur und Sprache, Menschen, die derselben Regierung und denselben Gesetzen unterstehen: Volk ist ein politischer bzw. kultureller Begriff.

Mit dem Begriff Rasse dagegen bezeichnet man Wesen „die durch gleiche Erbmerkmale miteinander verbunden und von anderen unterschieden sind“ (Weinert 1935 S. 2); oder wie Martin (1928 S. 8) definiert: „Die einer Varietät (Rasse) angehörenden Individuen müssen eine Summe von Merkmalen gemeinsam haben und sich durch eben diese bestimmte Merkmalkombination (Merkmalkomplex) von anderen Formgruppen unterscheiden lassen.“ Rasse ist also ein biologischer Begriff. Wie viele Merkmale nun zu einem Merkmalkomplex gehören müssen, um ihre Träger, die einzelnen Individuen zu einer Rasse zusammenfassen zu können, ist natürlich nicht festgelegt: Für die Rassenabgrenzung sind keine Regeln vorgeschrieben. Es werden daher bei Rassengegenüberstellungen oft sehr verschiedene Gruppen umfaßt.

Eine allgemein anerkannte und gebräuchliche Einteilung des Menschengeschlechtes in Unterarten, Rassen und Unterrassen gibt es noch nicht. Es sind eine Reihe diesbezüglicher Vorschläge gemacht worden, von denen einige hier aufgeführt seien. Die einfachste Einteilung ist wohl die nach der Hautfarbe, die drei Hauptrassen unterscheidet: die weiße (leucoderme), gelbe (xanthoderme) und schwarze (melanoderme) Rasse. Innerhalb dieser Hauptrassen wird dann vielfach nach dem Grade der Entwicklung untergegliedert. Andere Gliederungen berücksichtigen in erster Linie geographische Momente. Wieder andere teilen lediglich nach morphologischen Merkmalen ein. Und endlich gibt es noch die Gliederungen, die die Menschenrassen nach stammesgeschichtlichen Gesichtspunkten ordnen, mit der niedrigsten Rasse beginnend und mit der höchsten endend. Dieses Nebeneinander verschiedener Klassifikationen der Menschenrassen nach verschiedenen Gesichtspunkten erschwert das Studium rassenkundlicher Dinge und kann häufig zu Mißverständnissen führen.

Die morphologischen Merkmale, nach denen das Menschengeschlecht gegliedert wird, betreffen in erster Linie den Wuchs, den Schädel, die Haut- und Haarfarbe und die Haarform. Es soll nun versucht werden, auf Grund der vorhandenen Literatur festzustellen, ob sich auch an den Zähnen lebender Menschenrassen Unterschiede und Rassenmerkmale beobachten lassen.

Mit dieser Frage, ob und welche Rassenmerkmale sich am menschlichen Gebiß feststellen lassen, beschäftigt sich Adloff (1908). Es stand ihm für seine Untersuchungen nicht genügend Material zur Verfügung, um diese Frage endgültig zu beantworten. Er hält die Bedingungen, die das menschliche Gebiß formen, für zu gleichartig. So schreibt er (S. 52): „Es (das Gebiß) erscheint zu wenig abhängig von Klima und den sonstigen äußeren Lebensbedingungen, die die Differenzierung des Menschen in verschiedene Rassen und ihre weitere Entwicklung hervorgerufen haben, so daß Rassenunterschiede im Gebiß ausgeschlossen erscheinen.“ Als einziges für die Formveränderung der Molaren in Betracht kommendes Moment hält er die verschiedene Art der Ernährung — ob

vorwiegend Fleisch- oder Pflanzennahrung. Abschließende Untersuchungen, die diese Frage klären sollen, liegen noch nicht vor. Wenn man die Gebisse verschiedener Rassen miteinander vergleicht, so erscheinen sie im Großen und Ganzen gleichartig. Man ist geneigt, die geringen Abweichungen als individuelle Schwankungen zu deuten. Untersuchungen, die sich auf ein umfangreiches Material stützen, zeigen jedoch, daß sich einige dieser Abweichungen als Merkmale bestimmter Rassen herauskristallisieren. Leider sind bis heute solche Untersuchungen, die sich auf wirklich zahlenmäßig reiches Material stützen, noch sehr selten.

Durch die bereits oben erwähnte Gleichartigkeit der Entwicklungsbedingungen des menschlichen Gebisses ist natürlich nicht zu erwarten, daß seine Rassenmerkmale so ausgeprägt und bei allen Individuen einer Rasse in Erscheinung treten und sich nur auf diese eine Rasse beschränken, wie etwa die Hautfarbe oder Haarform der Neger. Dies um so eher, als infolge der Rassenvermischung die an sich schon geringen Rassenunterschiede im Gebiß noch mehr verwischt werden.

Die Untersuchungen der Zähne auf Rassenmerkmale beziehen sich auf ihre absolute Größe, die sich durch die Dimensionen der Breite, Dicke und Höhe bestimmen läßt, ihre relative Größe (Größenverhältnis von J_1 zu J_2 , Volumzu- oder -abnahme der Molaren) sowie ihre Form, Kauflächengestaltung und Höckerzahl, ferner auf die Form und Größe der Wurzeln und auf ihre Entwicklung und Durchbruchfolge. Da für die Begriffe der Zahndimensionen Breite, Dicke und Höhe von den verschiedenen Autoren keine einheitlichen Bezeichnungen angewandt werden, so lasse ich hier die Erklärung dieser Begriffe nach Martin (1928) folgen:

„Zahnbreite = dem Abstand der beiden an den Approximalflächen, d. h. an der medialen und distalen Fläche am meisten ausladenden Punkte.“

„Zahndicke: Abstand der vorstehendsten Punkte der lingualen und labialen resp. buccalen Flächen eines Zahnes voneinander.“

„Zahnhöhe: Abstand der Schneidekante vom Zahnfleischsaum, resp. vom Unterrand der Schmelzkappe.“ Bei Incisiven wird von der Mitte der Schneidekante gemessen, bei Cuspidaten und Bicuspidaten von der Spitze des äußeren Höckers und bei Molaren vom Grund der Einkerbung zwischen den zwei äußeren Höckern.

Alle anderen Bezeichnungen für diese drei Begriffe habe ich in dieser Arbeit durch die entsprechenden obigen Bezeichnungen ersetzt.

Die ersten Versuche, auch an den Zähnen rassische Eigentümlichkeiten festzustellen, stammen aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. So veröffentlichte *Lambert* (1877) die Ergebnisse einer Untersuchung an den Zähnen von 10—15 tausend Schädeln. Seine Messungen beziehen sich jedoch, gemäß der alten Einteilung in die weiße, gelbe und schwarze Rasse, auf zu große Gruppen. Infolgedessen lassen seine Maße einen Vergleich mit den Ergebnissen jüngerer Arbeiten, die sich auf kleinere Rassengruppen beziehen, kaum zu. *Lambert's* Messungen scheinen zudem noch ziemlich ungenau zu sein, so daß sie für eine genaue anthropologische Beurteilung wertlos sind. Das Gleiche gilt auch von den phantastisch anmutenden Berichten von *Miklucho-Maclay* (1876) über die großen Zähne der Melanesier (Bewohner der Admiralitäts-Inseln). Eine Kronenlänge (Höhe) von 22 mm, wie sie *Miklucho-Maclay* angibt, ist wohl dadurch zu erklären, daß der Autor die Zahnhöhe von der Kaukante bis zum Zahnfleischsaum an Zähnen gemessen hat, an denen der Knochen samt Zahnfleisch sich vom Zahnhals zurückgezogen hatten. Die größte bis jetzt gemessene Zahnhöhe beträgt 14,0 mm an einem oberen J₁ (de Terra 1905). Bei Maßangaben von 19 mm für die Schneidezahnbreite und 11 mm für die Dicke und beim Betrachten der dazugehörigen Abbildungen kann man sich des Verdachtes nicht erwehren, daß hier Zahnsteinablagerungen mitgemessen wurden.¹⁾

1) Miklucho-Maclay war kein Zahnarzt, sondern Anthropologe.

Hierher gehört auch der Bericht v. R o e p f f o r f f 's (1881) über die großen Zähne der Nikobaren (Eingeborene von Nancowry, Camerta und Trienkut-Inseln), der allerdings keine Maßangaben enthält. Eine auf V i r c h o w 's Veranlassung vorgenommene Nachprüfung und Untersuchung ergab, daß hier tatsächlich die „Großzähigkeit“ durch enorme Zahnsteinablagerung vorgetäuscht worden war. Auf den Wert exakter Zahnmessungen wurde jedoch auch damals schon hingewiesen (Schaafhausen 1883), weniger jedoch um Rassenmerkmale recenter Rassen festzustellen, als vielmehr die stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen zu klären. So ist denn bei Messungen das Hauptinteresse den Funden fossiler Schädel und Kiefer zugewandt.

Die ersten wissenschaftlich exakten Messungen und Untersuchungen an den Zähnen von Rassen Schädeln veröffentlichte d e T e r r a (1905). Seine Untersuchungen erstrecken sich auf ein Material von ca. 1000 Schädeln vieler Völker und Rassen. Verschiedene Gruppen sind dabei nur durch geringe Schädelzahl vertreten, wodurch einige Ergebnisse, wie d e T e r r a selbst zugibt, mit Vorsicht aufzunehmen sind. Ihm gebührt aber das Verdienst, als Erster eine genaue Meßtechnik und Untersuchungsmethodik vorgeschlagen zu haben. d e T e r r a beachtet bei seinen Untersuchungen alle Maße und morphologischen Einzelheiten sämtlicher Zähne, wie es seither noch von keinem Autor geschehen ist.

Die Untersuchungen A z o u l a y 's und R e g n a u l t 's (1893) und die R e g n a u l t 's (1894) erstrecken sich lediglich auf die Form der Schneidezähne, Eckzähne und Molaren. Die neueren Studien M o n t e l i u s ' (1933) an Chinesenzähnen befassen sich ausschließlich mit der Form der Schneidezähne. H r d l i c k a (1923) untersucht nur die unteren Molaren einiger Rassen und läßt die übrigen Zähne seines reichhaltigen Materials unberücksichtigt.

In neuerer Zeit sind nun wieder einige umfassendere Untersuchungen an den Zähnen afrikanischer Rassen vorgenommen worden. S h a w (1931) hat sowohl die Zähne als auch die Kiefer der Bantu-Rassen an reichhaltigem Material eingehenden Messungen und Untersuchungen unterzogen. Die rassischen Eigentümlichkeiten

der Zähne bei Buschmännern, Hottentotten, Negern und deren Bastarden versucht Abel (1933) klarzulegen. Über die Form und Größe der Wurzeln sowie über die Verschiedenheiten im Zahndurchbruch bei einzelnen südafrikanischen Stämmen geben uns die Forschungsergebnisse Proell's (1934) Aufschluß.

Die Zahngröße.

Bei der Untersuchung von Zähnen auf Rassenmerkmale drängt sich wohl zuerst die Frage auf: Ist die Zahngröße ein Rassenmerkmal? Diesbezügliche vergleichende Zusammenstellungen liegen noch nicht vor. Ich habe nun versucht, die betreffenden Messungen der im vorigen Kapitel kurz besprochenen Arbeiten miteinander zu vergleichen und auszuwerten.

Dies ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. So müssen die am umfangreichsten Material angestellten Messungen Lambert's (1877) aus den oben bereits erwähnten Gründen ausgeschieden werden. Es bleiben noch zum Vergleich die Messungen de Terra's (1905), Shaw's (1931) und Abel's (1933).

Shaw und Abel haben für jede Zahndimension bei einer Rasse aus den Maßzahlen das Mittel errechnet. So hat Shaw z. B. für Bantu als mittlere Breite des J_1 sup. 8,9 mm, Abel für Buschmänner als mittlere Dicke des P_2 inf. 5,2 mm errechnet usw. Diese Mittelmaße lassen sich nicht mit den Mittelmaßen de Terra's vergleichen. Während Shaw und Abel für eine Zahndimension einer Rasse das Mittelmaß errechneten, hat de Terra für alle von ihm untersuchten Rassengruppen bei jeder Zahndimension zwei Mittelmaße errechnet: ein Maximal- und ein Minimalmittel. de Terra erhielt also diese Mittelmaße, indem er bei jeder Zahndimension von allen Maßen einer Gruppe bzw. Rasse je die Maximal- und Minimalzahlen herausuchte, die von etwa 60 Gruppen bzw. Rassen herrührenden Maximal- und Minimalzahlen addierte und durch die Anzahl der Gruppen bzw. Rassen dividierte. de Terra errechnete also z. B. für alle von ihm untersuchten Gruppen als Maximum- bzw. Minimummittel der Breite des J_1 sup. 9,5 bzw. 8,3 mm. In seiner umfangreichen

Tabelle, in der die 32 Zähne mit je 3 Maßen vertreten sind, bilden Maximum- und Minimummittel ein Niveau, über oder unter dem sich jeweils die einzelnen Gruppen bzw. Rassen mit der entsprechenden Maximal- oder Minimalzahl in steigender bzw. fallender Reihenfolge einordnen. Erscheint eine Gruppe bei irgend einem Zahnmaß nicht in der Tabelle, so liegt sie mit dem betreffenden Zahnmaß zwischen Maximum- und Minimummittel, wodurch die Tabelle eine Entlastung erfährt.

Hierbei konnte nun die Terra feststellen, daß sich die Timoresen, Australier, Papua und Dschagga durch große Zahnmaße auszeichnen, daß dagegen die Birmanen und Feuerländer kleine Zahnmaße haben. Bei den Feuerländern sind allerdings die Molarenmaße im Verhältnis zu den Maßen der übrigen Zähne etwas höher — sie erreichen die Maße der Europäer und manchmal mehr — oder mit anderen Worten, die Molaren der Feuerländer scheinen im Verhältnis zu den anderen Zähnen größer zu sein als bei den übrigen Rassen. Die Europäer stehen mit ihren Zahnmaßen etwa in der Mitte zwischen den beiden obigen Gruppen, aber etwas unter dem Teilstrich zwischen Maximum- und Minimummittel.

Um nun die Maße Shaw's und Abel's untereinander und mit denen der Terra's vergleichen zu können, habe ich so verfahren, daß ich die Maximal- und Minimalzahl jeder Zahndimension der von Shaw und Abel untersuchten Rassen in die entsprechenden Rubriken der Tabelle der Terra's eingetragen habe, wie die Terra auch seine Maximal- und Minimalzahlen seiner Zeit eingeordnet hat. Eine neue Berechnung des Maximum und Minimummittels, die auch die Maximal- und Minimalzahlen der von Shaw und Abel untersuchten Rassen berücksichtigen müßte, würde zwar eine geringe Verschiebung des Maximum- und Minimummittels hervorrufen, wäre aber natürlich für die Reihenfolge in der Größenordnung der einzelnen Rassen bedeutungslos. Das Maximum- und Minimummittel wurde von der Terra nur deshalb berechnet, damit seine ohnehin schon umfangreiche Tabelle durch die zwischen Maximum- und Minimummittel fallenden Gruppen bzw. Rassen eine Entlastung erfahren sollte.

Ordnet man nun, wie oben beschrieben, die von Shaw 1931 an Bantuschädeln festgestellten Zahnmaße in die Terras Tabelle ein, so sieht man, daß die Banturaffen wie die Europäer auch ungefähr in der Mitte der oben erwähnten Gruppen stehen. Während jedoch, wie wir sahen, die Europäer näher am Minimum stehen, nähern sich die Banturaffen etwas mehr dem Maximum. Besonders stark kommt dies bei den Molaren zum Ausdruck.

Wenn man nun die Mittelmaße Abel's für Bantu-Zähne mit denen Shaw's vergleicht, so sieht man, daß Abel's Mittelmaße durchweg höher sind als die Shaw's — bis zu 1,1 mm. Da Shaw's Messungen auf einem viel umfangreicheren Material fußen als die Abel's¹⁾, so habe ich die Abel'schen Maße für Bantuzähne nicht mit zum Vergleich herangezogen.

Gliedert man nun die von Abel (1933) an Buschmannschädeln erhaltenen Zahnmaße in die Terra's Tabelle ein, so stellt man fest, daß die Buschmänner mit ihren Zahnmaßen vom J₁ bis C einschließlich noch unter den Feuerländern stehen und von P₁ an mit den Feuerländern gleich sind. Bezüglich der Molaren scheinen also die Buschmänner die gleiche Zahngröße aufzuweisen wie die Feuerländer, während ihre Schneide- und Eckzähne noch kleiner sind als die der Feuerländer. Diese Kleinheit der Zähne im frontalen Abschnitt bei Buschmännern ist auch aus Abb. 1 zu ersehen.

Vergleichen wir endlich noch Abel's Maße für Hottentottenzähne mit denen der übrigen Gruppen in obiger Weise, so sehen wir, daß sie im Durchschnitt etwas über den Feuerländern stehen.

Um die Reihenfolge der einzelnen Gruppen bzw. Rassen bezüglich ihrer Zahndimensionen zu veranschaulichen, habe ich sie in einer Tabelle nach der Größe der Zahndimensionen geordnet. Die in einer Wagerichten stehenden Gruppen weisen im Durchschnitt nur geringe Unterschiede in ihren Zahndimensionen auf.

1) Shaw hat die Zähne von 33 Schädeln gemessen; Abel gibt für die von ihm untersuchten Bantu-Schädel keine Zahl an, sondern allgemein 7 Neger Schädel.

Tabelle I:

de Terra	Timorefen, Australier, Papua, Dſchagga
Shaw	Bantu
de Terra	Europäer
Abel	Hottentotten
de Terra	Birmanen, Feuerländer
Abel	Buſchmänner.

Die Feuerländer und Buſchmänner erreichen jedoch, wie ſchon erwähnt, mit ihren Molarengroßen die Europäer, ſo daß ſich für die Molarendimension die Tabelle I wie folgt ändern muß:

Tabelle II:

de Terra	Timorefen, Australier, Papua, Dſchagga
Shaw	Bantu
de Terra	Europäer, Feuerländer — Buſchmänner (Abel) —
Abel	Hottentotten
de Terra	Birmanen.

Es iſt wohl kaum anzunehmen, daß die obigen Tabellen wegen des verhältnismäßig oft geringen Materials als endgültig feſtlegend anzusehen ſind. Vielmehr werden ſicherlich bei der Unterſuchung umfangreicherer Materials einige Verſchiebungen auftreten. Jedoch die an den Enden ſtehenden Gruppen, die Australier, Papua, Dſchagga und Timorefen einerſeits und die Birmanen, Feuerländer und Buſchmänner andererſeits dürften wohl ihre Stellung behalten.

So hat auch Adloff (1908) auf die Großzähigkeit der Melaneſier (Timorefen und Papua), die er an 170 Schädeln beobachtete, aufmerkſam gemacht. Die wenigen Maßzahlen, die Adloff angiebt, liegen alle um die Maximalzahlen der von de Terra zuſammengeſtellten Maximal- und Minimalgrößen der Zähne aller Raffen. Desgleichen hat Adloff (1908) auch einige Buſchmannſchädel unterſucht und dabei die auffallende Größe der Zähne beobachtet; Maßangaben fehlen hier.

Auch Proell (1934) beobachtete auf ſeinen Forſchungsreifen in Südafrika die auffallende Kleinheit der Buſchmannszähne im

frontalen Abschnitt, die auch auf untenstehender Abbildung deutlich zu erkennen ist.




Abb. 1

Größenunterschied der Zähne bei einem Buschmann und Bantu-Neger.
(Nach Proell 1934.)

de Terra (1905) ist nun der Ansicht, „daß die Dimensionen der Zähne kein für die Rassendiagnose maßgebendes Merkmal sind.“ (S. 95.) Die Variationen in der Zahngröße sind nach seiner Meinung vielmehr individuell. Er schreibt weiter: „Ich nehme an, daß sich die Großzähigkeit nach der Größe der Kiefer, der Nahrungsweise und der Vererbung richtet; in dieser Hinsicht dürfte man gewisse Gruppen als großzähig bezeichnen, z. B. die Timor-esen und Australier.“ Dazu möchte ich folgendes bemerken: Auf Grund eines einzigen Merkmals wird man wohl nie eine Rassendiagnose stellen dürfen; dazu ist vielmehr stets eine bestimmte Merkmalkombination (Merkmalkomplex) erforderlich (Martin 1928). Wenn sich nun bei einzelnen Rassen bedeutende Unterschiede in der Zahngröße herausgestellt haben, so ist wohl anzunehmen, daß eine bestimmte Durchschnittszahngröße bei einer Rasse auch zu ihrem Merkmalkomplex gehört. Darüber, ob nun

Groß- oder Kleinzähigkeit von der Nahrungsweise abhängig ist, fehlen bis heute abschließende Untersuchungen. Wenn sich die Großzähigkeit nach der Größe der Kiefer und der Vererbung richtet, was wir heute mit Bestimmtheit annehmen dürfen, so spricht dies nicht gegen die Zahngröße als Rassenmerkmal, sondern bezüglich der Vererbung direkt dafür. (Weinert 1935.)

So möchte ich denn Adloff (1936) bezüglich der Zahngröße als Rassenmerkmal zustimmen; er schreibt: „Das Gebiß des heutigen Menschen ist im allgemeinen durchaus gleichartig gestaltet. Rassenmerkmale kommen jedoch in gewissem Grade vor. Wie es große und kleine Rassen gibt, so gibt es auch solche mit im Durchschnitt großen und solche mit kleinen Zähnen.“

Der Dental-Index.

Es ist nun versucht worden, die Zahngröße auch durch einen Index, den Dental-Index, auszudrücken. Diesen erhält man nach der Formel:

$$\text{Dental-Index} = \frac{\text{Dental-Länge} \times 100}{\text{Basionasallänge}}$$

Die Dental-Länge ist die direkte Entfernung der Mesialfläche des P₁ von der Distalfläche des M₃; die Basionasallänge ist die gradlinige Entfernung des Basion vom Nasion (Schädelbasislänge).

Der Dental-Index wurde von Flower (1885) eingeführt. Von einem Mittel aller von ihm gefundenen Indices — 43 — ausgehend, unterscheidet Flower 3 Gruppen: Mesodonte zwischen 42 und 44, Mikrodonte unter 42 und Makrodonte (Megadonte) über 44. Nach seinen Untersuchungen sind:

Makrodont: Melanesier, Andamaner, Australier, Tasmanier.

Mesodont: Chinesen, amerik. Indianer, Malayen, afrik. Neger.

Mikrodont: Europäer, Alt-Ägypter, Polynesier.

Aber schon die nächsten Bestimmungen des Dental-Index durch einen anderen Forscher zeigten die geringe Zuverlässigkeit des Flower'schen Index zur Bestimmung der Zahngröße als Rassenmerkmal. So sind nach den Untersuchungen de Terra's (1905)

die Europäer mit einem Index von 43,45 mesodont, die nach Flower mit einem Index von 41,1 mikrodont fein sollen. Desgleichen sind nach de Terra die Alt-Ägypter mit 42,62 mesodont und nach Flower mit 41,0 mikrodont. In folgender Tabelle stelle ich die Maße einiger wichtiger Gruppen bzw. Rassen aus de Terra's Arbeit zusammen:

Tabelle III:

Makrodont:	Unyamwesi	46,15
	Peruaner	45,2
	Aino	44,4
Mesodont:	Dschagga	43,9
	Australier	43,79
	Papua	43,7
	Chinesen	43,48
	rec. Europäer	43,45
	Malayen	43,30
	Batak	43,05
	Feuerländer	42,9
	Alt-Ägypter	42,62
	Bantu (Shaw 1931)	42,6
	Tamilen	42,37
Mikrodont:	Araber	41,55
	Neu-Ägypter	41,3
	Neger Nord-Afrika	40,06
	Birmanen	38,5
	Nubier	38,47

Während Flower den Dental-Index nur für den Oberkiefer bestimmte, hat de Terra ihn auch für den Unterkiefer errechnet. Von den jüngeren Autoren hat nur noch Shaw (1931) den Dental-Index bestimmt und zwar für die Bantu-Rassen; diese sind nach Shaw mit 42,6 mesodont.

Vergleicht man nun weiter einmal die nach dem Dental-Index und nach den absoluten Dimensionen der Zähne aufgestellten Ta-

bellens miteinander, so kann man feststellen, daß zwar für die Birmanen die Bezeichnung mikrodont sich mit der nach den absoluten Zahnmaßen gewonnenen Bezeichnungen kleinzählig deckt, daß aber die nach den absoluten Zahnmaßen als großzählig zu bezeichnenden Australier, Melanesier und Dschagga nach dem Dental-Index mesodont sind. Desgleichen sind die bezüglich ihrer Zahnmaße kleinzähligten Feuerländer nach dem Dental-Index mesodont. Und endlich stehen die Europäer, die zwar nach dem Dental-Index (de Terra) und nach den absoluten Zahnmaßen mesodont sind bzw. mittelgroße Zähne haben nach dem Dental-Index näher am Maximum und, wie wir oben sahen, nach den absoluten Zahnmaßen näher am Minimum. Umgekehrt dagegen die Bantu, die ebenfalls mesodont sind bzw. mittelgroße Zähne haben: Sie stehen nach den absoluten Zahnmaßen näher am Maximum und nach dem Dental-Index näher am Minimum, sogar noch unter den Feuerländern.

So hält denn auch schon de Terra 1905 den Dental-Index für ungeeignet zur Bestimmung der Zahngröße als Rassenmerkmal. Zunächst ist die Dentallänge nicht allein von der Breite der Prämolaren und Molaren abhängig, sondern auch von der Krümmung des Zahnbogens, an der sich bereits die Prämolaren mehr oder weniger stark beteiligen. Es kann so die Dental-Länge bei verschiedenen Schädeln trotz gleicher Breiten der Prämolaren- und Molaren-Serie kleiner oder größer ausfallen, je nach dem sich die Prämolaren mehr oder weniger an der Krümmung des Zahnbogens beteiligen. Andere Fehlerquellen können reduzierte Molaren bei sonst großen Zähnen darstellen. Ferner berücksichtigt die Dental-Länge von den 3 Dimensionen, die die Zahngröße mitbedingen, nur die Breite und läßt die Dicke und Höhe unberücksichtigt.

Wie sehr nun schließlich auch die Schädelbasislänge die Stellung einer Gruppe in der Tabelle beeinflussen kann — gleiche Zahnbögen vorausgesetzt — zeigt uns die bereits oben erwähnte Bestimmung des Dental-Index der Bantu-Rassen durch Shaw (1931): Nach den absoluten Zahnmaßen stehen die Bantu über den Europäern; da sie aber eine große Schädelbasislänge haben, so werden

sie trotz großer Zahnmaße in der Tabelle des Dental-Index unter die Europäer, sogar noch unter die Feuerländer verwiesen.

Der Flower'sche Dental-Index kann also niemals zur eindeutigen Bestimmung der Zahngröße als Rassenmerkmal herangezogen werden. Er stellt vielmehr lediglich einen Meßstandard für die Beziehung zwischen der Größe der Okklusionsoberfläche und der Schädelbasislänge dar. Infolgedessen dürften die Bezeichnungen mikro-, meso- und makrodont für die einzelnen Gruppen wohl kaum noch dem wirklichen Sinn entsprechen. Weitere Untersuchungen über den Dental-Index liegen nicht vor.

Die Form und das Größenverhältnis bei einzelnen Zahnarten.

Es soll nun weiter untersucht werden, ob auch an der Form der einzelnen Zahnarten und an dem Größenverhältnis innerhalb derselben Rassenmerkmale festzustellen sind. Unter dem Größenverhältnis innerhalb der Zahnarten verstehe ich z. B. die Breiten-differenz zwischen J_1 und J_2 sup. oder das Größenverhältnis der einzelnen Molaren zueinander, kurz Volumzu- oder -abnahme der Molaren genannt.

Die Schneidezähne:

a) Form.

Den breitesten Raum bei der Untersuchung der Form menschlicher Zähne nehmen naturgemäß die Schneidezähne ein. Die Untersuchungen über ihre Form beschränken sich in der Hauptsache auf die oberen Incisiven. Bei den unteren scheinen außer der Größe und den individuellen Schwankungen in der Form keine Unterschiede vorzuliegen. Die Form der oberen Incisiven wird bedingt durch den Verlauf der Seitenwände — ob parallel oder zur Kaukante hin divergierend — und durch die Beschaffenheit der palatinalen Fläche.

Über den Verlauf der Seitenwände bei verschiedenen Rassen haben Azoulay und Regnault (1893) Untersuchungen angestellt. Durch Vergleich der Breite am Zahnhals mit der an der Kaukante stellten sie fest, daß die Seitenwände der oberen Incisiven

bei Negern, Australiern und Papua zur Schneidekante hin stark divergieren, während sie bei der gelben Rasse sowie bei den Europäern und Hindu zur Schneidekante hin parallel werden. Diese Breitendifferenz ist beim Neger doppelt so groß wie beim Inder. Wenn auch das Untersuchungsmaterial der beiden Forscher zahlenmäßig gering ist, so scheint doch der Verlauf der Seitenwände für die am weitesten auseinanderstehenden Gruppen, die Neger einerseits und die Europäer und Inder andererseits so charakteristisch zu sein, daß man ihn für diese Gruppen als Rassenmerkmal ansprechen kann.

Von einem anderen Gesichtspunkt ausgehend hat Williams (1914) versucht, den Verlauf der Seitenwände bei oberen mittleren Incisiven zu charakterisieren. Nach seinen Untersuchungen soll man bezügl. des Verlaufs der Seitenwände an diesen Zähnen drei Grundtypen unterscheiden können, die sich, wenn sie auch ursprünglich von Williams zum Studium von Konstitutionstypen verwandt wurden, vielleicht ähnlich den Untersuchungen Azouley's und Regnault's zu rassenkundlichen Studien verwenden lassen.

Typ I. Die Seitenwände verlaufen von der Kaukante aus bis zur Mitte der Krone parallel oder fast parallel.

Typ II. Die Seitenwände konvergieren von der Kaukante zur Wurzel hin; mesial verlaufen sie manchmal konvex, distal manchmal etwas konkav.




Abb. 2

Typ. III. Die Seitenwände verlaufen etwas konvex; im Ganzen ist Typ III durch abgerundetere Linien als Typ I und II charakterisiert.

Vergleicht man nun einmal an diesen 3 Typen die Breite an der Kaukante mit der am Zahnhals nach Azoulay und Regnault (1893), so sieht man, daß die Typen I und II im ganzen zur Kaukante hin divergierende Seitenwände haben, also den von Azoulay und Regnault für Neger, Australier und Papua gefundenen Formen entsprechen.

Von den Williams'schen Grundtypen hat bis jetzt nur Shaw (1931) bei seinen Untersuchungen der Bantuzähne Gebrauch gemacht. Er fand, daß sich die 3 Typen auf Bantuzähne wie folgt verteilen:

Typ I	Typ II	Typ III
38%	12%	50%

Dieses Ergebnis stimmt anscheinend nicht mit dem von Azoulay und Regnault gefundenen überein, wonach bei Bantu, als einer Negerrasse, die Williams'schen Typen I und II überwiegen müßten. Ob nun die Bantu tatsächlich in dieser Hinsicht nicht mit anderen Negerrassen übereinstimmen, müssen weitere Untersuchungen ergeben.

Nicht minder wichtig für die Formgestaltung oberer Schneidezähne ist neben dem Verlauf der Seitenwände die Beschaffenheit der palatinalen Fläche. Diese ist nach neueren Autoren (Hrdlicka 1911¹⁾ und 1921, Shaw 1931 und Montelius 1933) entweder schaufelförmig in verschiedenen Graden oder nicht schaufelförmig. Diese Schaufelform wird nach Hrdlicka 1911¹⁾ dadurch bedingt, daß die lateralen Ränder der Schneidezähne an der palatinalen Fläche wulstartig ausgebildet sind, wodurch am palatinalen Zahnhals ein rudimentärer Höcker entsteht. Shaw 1911¹⁾ nennt diese Zähne „shovel-shaped teeth“, schaufelförmige Zähne.

1) Zitiert nach Gregory. 1921.

Auch Adloff hat schon 1908 auf diese Form an oberen Schneidezähnen aufmerksam gemacht, wenn er auch dafür den Ausdruck „schaufelförmige Zähne“ noch nicht gebraucht hat. Adloff (1908) beschreibt S. 25 diese Form der Zähne folgendermaßen: „Es konnte aber auch ein Tuberkulum vollständig fehlen. Dann stellte die ganze linguale Fläche eine Konkavität vor, die jederseits von einem stark erhöhten Seitenrand umgeben war. Die Seitenwände trafen dann oberhalb des Zahnhalfes in einem spitzen Winkel zusammen“.

Der von Hrdlicka 1911 und 1921 für diese Zahnform geprägte Begriff „shovel-shaped teeth“ ist nicht identisch mit dem für die Kronenform oberer Incisiven allgemein gebräuchlichen Ausdruck „schaufelförmige Krone“, sondern beschränkt sich lediglich auf solche oberen Schneidezähne, welche die oben nach Adloff und Hrdlicka beschriebene Form der palatinalen Fläche haben.

Durch Untersuchungen an reichhaltigem Material konnte Hrdlicka 1911 feststellen, daß schaufelförmige Zähne bei Gruppen der weißen Rasse selten auftreten, bei amerikanischen Indianern dagegen selten fehlen. Montelius (1933) fand die Schaufelform ebenfalls in hohem Prozentsatz bei amerikanischen Indianern (Arikara- und Hopi-Indianern) nicht nur an allen oberen, sondern auch an allen unteren Schneidezähnen.

Weitere Untersuchungen zeigten, daß die schaufelförmigen Zähne auch bei anderen zur gelbbraunen Rasse gehörenden Gruppen in hohem Prozentsatz auftreten, so nach Hrdlicka (1921) bei Malayen, Mongolen, Chinesen und Japanern. Montelius (1933) fand bei feinen Untersuchungen an Chinesen, daß 79% feines reichen Untersuchungsmaterials einen oder mehrere schaufelförmige Zähne hatten.

Um den Grad der Ausprägung der Schaufelform auszudrücken, hat Hrdlicka (1921) drei Entwicklungsgrade unterschieden: Die am stärksten entwickelte Schaufelform nennt er „shovel“, die weniger stark entwickelte „semi-shovel“ und die am wenigsten entwickelte, aber noch ausgesprochene Schaufelform „trace-shovel“.

Ein objektiver Anhaltspunkt zur Unterscheidung dieser drei Grade ist bei Hrdlicka nicht angegeben.

Auch Shaw (1931) hat die Bunturassen auf schaufelförmige Zähne nach Hrdlicka's Einteilung untersucht und im Ganzen nur 16,6% Schaufelform festgestellt. Desgleichen ist bei amerikanischen Negern nach Hrdlicka (1921) die Schaufelform nicht so häufig als bei den Völkern der gelbbraunen Rasse. Es scheinen demnach die schaufelförmigen Zähne ein Merkmal der gelbbraunen Rasse zu sein.

b) Das Größenverhältnis von J_1 zu J_2 sup.

Der seitliche Schneidezahn ist bekanntlich kleiner als der mittlere. Dieser Größenunterschied zeigt sich am deutlichsten in der Breitendifferenz beider Zähne, die nach den Untersuchungen de Terras (1905) bei den verschiedenen Rassen verschieden groß zu sein scheint. Die Breitendifferenz zwischen J_1 und J_2 sup. bei einer Rasse bzw. Gruppe erhält man durch Vergleich der betreffenden Maximalmaße.

Um auch die neueren Messungen von Shaw und Abel, die zwar in ihren Arbeiten auf diese Breitendifferenz nicht eingehen, mit den Zahlen de Terras zu vergleichen, habe ich aus den Maßen Shaw's und Abel's die Breitendifferenz für die von ihnen untersuchten Rassen bestimmt und mit den Zahlen de Terra's in einer Tabelle zusammengestellt.

Tab. IV

Australier	2,9 mm
Singhalesen	2,5 „
Tamilen und Neger Nord-Afrikas	2,4 „
Araber	2,3 „
Südafrik. Neger (ohne Bantu) (Abel 1933)	2,2 „
Neger unbestimmter Provenienz	2,1 „
rec. Europäer und — Bantu (Shaw 1931) —	2,0 „
Alemannen, Neu-Ägypter und Battak	1,9 „
Feuerländer und Birmanen	1,8 „
Hottentotten (Abel 1933)	1,5 „

Azteken und Dschagga		1,4	„
Chinesen		1,2	„
Malayen		1,0	„

Um ausgesprochene Zufallzahlen zu vermeiden, habe ich in die Tabelle nur solche Gruppen bzw. Rassen aufgenommen, von denen mindestens an 4 verschiedenen Schädeln die Schneidezähne gemessen wurden.

De Terra (1905 S. 152) ist nun der Ansicht: „daß die Differenz in der Breite der mittleren und seitlichen Incisiven bei unkultivierten Völkern größer ist als bei uns“ und er schreibt weiter „und es ist vielleicht nicht ein bloßer Zufall, daß die Australier an erster Stelle der Reihe figurieren“. Die vorliegende Ergänzung der Reihe de Terras durch die Maße Shaws und Abels spricht aber gegen die obrige Ansicht de Terra's, da die Hottentotten, die bedeutend kleinere Breitendifferenz aufweisen als die rec. Europäer, doch wohl weniger kultiviert zu bezeichnen sind als die recenten Europäer.

Die vorliegende Tabelle scheint dagegen darauf hinzudeuten, daß die Breitendifferenz zwischen J_1 und J_2 sup. mit der Größe der absoluten Zahnmaße aller Zähne zunimmt: Man vergleiche die Reihenfolge der Australier, Bantu, rec. Europäer und Hottentotten in Tab. IV und Tab. I. Ob nun tatsächlich bei großzahnigen Rassen die Breitendifferenz groß und bei kleinzahnigen klein ist, kann nur durch weitere Messungen an umfangreichem Material endgültig nachgewiesen werden.

Die Eckzähne.

Für die Formgestaltung der Eckzähne ist ebenso wie für die der Schneidezähne in erster Linie der Verlauf der Seitenwände maßgebend — ob mehr oder weniger stark zur Kaukante divergierend. Diesbezügliche Untersuchungen veröffentlichte Regnault (1894). Wie bei Schneidezähnen hat er auch bei Eckzähnen den Verlauf der Seitenwände durch Vergleich der Breite am Zahnhals mit der nahe der Kaukante unterfucht. Diese Breitendifferenz beträgt bei:

Tab. V

Neu Hebridiern	2,2 mm
Negern	2,0 „
Australiern	1,9 „
Bengalen	1,68 „
Tahitiern	1,6 „
Europäern	1,5 „

Bei Negern und Australiern sind also nach den Untersuchungen Regnaults (1894) die Seitenwände der Eckzähne ähnlich wie die der Schneidezähne zur Kaukante hin stärker divergierend als bei den Europäern.

Bei feinen Untersuchungen an Bantuzähnen stellte Shaw (1931) fest, daß die Eckzähne der Form nach nicht von denen rec. Europäer abweichen. Der obere Eckzahn ist allerdings manchmal so stark entwickelt wie nie bei rec. Europäern.

Abél (1933) bezeichnet die Eckzähne der Buschmänner und Hottentotten als „klein“, die der ersteren als „gedrungen“, die der letzteren als „zart“. Die Eckzähne der südafrikanischen Neger nennt er „groß und kräftig“.

Außer den Untersuchungen Regnault's (1894) ermöglicht die obige Art der Beschreibung von Eckzähnen es nicht, für irgend eine Rasse eine charakteristische Form herauszufinden.

Weitere Untersuchungen über die Formgestaltung der Eckzähne verschiedener Rassen liegen noch nicht vor. Die Fragen, ob die Eckzähne im Verhältnis zu den übrigen Zähnen bei einzelnen Rassen größer sind als bei anderen und ob eine bestimmte Gestaltung der Kaukante — eben oder spitz — bei einzelnen Rassen vorherrscht, müssen noch offen gelassen werden.

Die Prämolaren.

Was zunächst die allgemeine Formgestaltung der Prämolaren betrifft, so sind in den vorliegenden Untersuchungen keinerlei Anhaltspunkte dafür zu finden, daß eine bestimmte Prämolarenform für irgendeine Rasse oder Gruppe charakteristisch ist.

Bezüglich der Gestaltung der Prämolarenkauffläche stellte die Terra fest, daß diese bei Australiern verschiedentlich durch zahlreiche interstitielle Höcker (Zwischenhöcker) ausgezeichnet ist. Da er diese Erscheinung nur an den Prämolaren der Australier bemerkte, so bezeichnet er das Auftreten interstitieller Höcker am Prämolaren als „eine für diese Gruppe typische Erscheinung“. Was schließlich das Größenverhältnis von P_1 zu P_2 im Ober- und Unterkiefer betrifft, so läßt sich auch hier für keine Gruppe oder Rasse eine charakteristische Beziehung aufstellen.

Die Molaren.

Für die Formgestaltung der Molaren ist neben der Differenz zwischen der Breite am Zahnhals und der an der Kauffläche und dem Verhältnis von Dicke und Breite auch die Gestaltung der Kauffläche von Bedeutung. Über die Differenz zwischen der Breite am Zahnhals und der an der Kauffläche bei den verschiedenen Rassen geben uns wieder die Untersuchungen Regnault's (1894) Aufschluß:

Tab. VI

Australier	3,4 mm
Neger	2,6 „
Polynesier	2,3 „
Neu Hebridier u. Neu Kaledonier	2,1 „
Bengalen	2,1 „
Weißer	1,8 „

Diese Differenz ist also bei niederen Rassen, Australiern und Negern viel größer als bei weißen; bei Australiern fast doppelt so groß als bei den letzteren.

In engem Zusammenhang mit der Breitendifferenz zwischen Zahnhals und Kronen bei Molaren scheinen die neueren Feststellungen Proell's (1937) zu stehen. Nach Proell ist infolge der — im Verhältnis zu der Reduktion der Zähne viel weiter vorgeschrittenen — Kieferreduktion beim modernen Menschen die Einstellung der Zähne im Kiefer durch Raummangel behindert. Als Folge hiervon zeigt sich eine Umformung der Zahnkrone derart, daß aus

den Berührungspunkten der Zähne Berührungsflächen werden, eingehend mit Vertiefung der Fülluren (Abb. 3).




Abb. 3

Umwandlung der Berührungspunkte in Berührungsflächen.

(Nach Proell, 1937)

Aus obiger Abbildung ist zu sehen, daß Molaren mit Berührungspunkten eine größere Breitendirektion zwischen Hals und Krone aufzuweisen haben, als solche mit Berührungsflächen. Demnach ist auch zu erwarten, daß bei Rassen mit weniger stark reduzierten Kiefern diese Breitendirektion größer ist als bei Rassen mit weiter vorgeschrittener Kieferreduktion. Das ist, wie wir oben sahen, in der Tat der Fall. In Reginald Leakeys Untersuchungen bei Australern und Negern die Breitendirektion zwischen Hals und Krone wesentlich größer ist als bei Weißen.

Das Verhältnis von Dicke zu Breite wird durch den sogenannten Kronen-Index ausgedrückt. Man erhält ihn nach der Formel:

$$\text{Kronen-Index} = \frac{\text{Dicke} \times 100}{\text{Breite}}$$

H. J. Huxley (1921) hat an umfangreichem Material den Kronen-Index für die unteren Molaren einiger Rassen bestimmt. Da er bei jeder Gruppe für alle unteren Molaren zusammen einen mittleren Index errechnet hat, so lassen sich seine Zahlen nicht mit denen von Schour (1931) angeführten vergleichen, da dieser den Index für jeden einzelnen Molar in seiner Tabelle anführt, ohne einen mittleren Index aller Molaren errechnet zu haben. Aus der Arbeit H. J. Huxley's (1921) entnehme ich folgende Zahlen:

Tab. VII

Mittlerer Index aller Molaren bei:

Weißer	96,8
Ägypter	97,2

Melanesiern	97,4
Indianern	97,7
Eskimo	97,9
Negern	97,9

Es zeigen sich also von Gruppe zu Gruppe nur geringe Differenzen. Wirklich auffallend ist der Unterschied zwischen Weißen und Ägyptern einerseits und Eskimo und Negern andererseits. Dies bedeutet also, daß im Ganzen betrachtet, die unteren Molaren bei Eskimo und Negern im Verhältnis zur Breite dicker sind als bei Weißen und Ägyptern.

Shaw (1931) bestimmte als mittleren Index für jeden einzelnen Molar bei Bantu folgende Zahlen:

	M ₁	M ₂	M ₃
Oberkiefer	107,3	111,1	118,4
Unterkiefer	93,7	93,4	92,3

Andere Untersuchungen über die Beziehung von Dicke zu Breite bei Molaren liegen nicht vor.

Über die Höckerzahl der Molaren bei den verschiedenen Rassen und Völkern sind viele Untersuchungen angestellt worden. Die wichtigsten älteren Arbeiten hierüber hat de Terra (1905) untereinander und mit seinen Untersuchungsergebnissen verglichen, so daß es sich erübrigt, sie an dieser Stelle noch einmal vergleichend zu betrachten.

Die Höckerzahl der Molaren ist bei den verschiedenen Menschenrassen mehr oder weniger stark reduziert. Dies wird durch Höckerformeln zum Ausdruck gebracht, indem man die Höckerzahlen der drei aufeinanderfolgenden Molaren hintereinander schreibt. Es bedeutet z. B. 4 4 3 im Oberkiefer: der erste Molar hat 4, der zweite ebenfalls 4 und der dritte 3 Höcker. Wenn auch infolge der Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Höckerformeln (verschiedener Ausbildungsgrad der Höcker, starke Usur der Zähne) die Ergebnisse einzelner Autoren stark voneinander abweichen, so kann man doch leicht erkennen, daß bei niederen Rassen die Reduktion der Höckerzahl nicht so weit vorgeschritten

ist als bei höheren. Jedoch läßt sich für keine Rasse eine bestimmte Höckerformel aufstellen. Aus der Arbeit de Terra's (1905) entnehme ich eine Tabelle Batujeff's, der das Vorkommen der verschiedenen Höckerformeln nach Prozents ordnet:

Tabelle IX:

	Großrussen	Mongolen	Malayen	Neger	Aino
4 4 4	14,4%	21,5%	23,6%	29,5%	23,0%
4 4 3	41,0%	44,0%	41,9%	22,7%	46,0%
4 3 3	44,6%	34,5%	34,5%	47,8%	31,0%
5 5 5	5,8%	5,7%	12,6%	12,0%	—
5 4 5	25,8%	34,7%	42,0%	44,0%	12,5%
5 4 4	48,1%	43,0%	38,4%	44,0%	75,0%

de Terra selbst stellte z. B. fest, daß im Unterkiefer der fünfhöckerige Typ des zweiten Molaren bei Australiern in 73,3%, bei Papua in 30%, bei Negern in 28,5% und bei Europäern nur noch in 6% der von ihm untersuchten Fälle vertreten war. Shaw (1931) beobachtete den fünfhöckerigen Typ am zweiten unteren Molaren bei Bantu sogar noch in 31,9% der Fälle. Nach Abel's (1933) Untersuchungen sollen die Südafrikanischen Neger an allen unteren Molaren den fünfhöckerigen Typ bewahrt haben. Der zweite Molar im Oberkiefer zeigte nach de Terra (1905) den vierhöckerigen Typ bei Australiern in 80,9%, bei Papua in 82,3%, bei Negern in 57,1% und bei Europäern in 52,2% der Fälle. Die Rassen, die wir als großzähmig kennen lernten, weisen also eine geringere Reduktion der Höckerzahl auf als die übrigen.

Was nun weiter das Auftreten des Carabelli'schen Höckers bei den verschiedenen Rassen betrifft, so bin ich hier lediglich auf die Untersuchungen de Terra's (1905) angewiesen. Er fand das Carabellische Höckerchen bei:

Australiern	in 10,0%,
Battak	„ 9,7%,
Birmanen	„ 8,8%,
Ägyptern	„ 8,3%,
Europäern	„ 8,01%,

Chinesen	„ 7,4%,
Malayen	„ 3,6%

der untersuchten Schädel.

Bei Melanesiern fand de Terra keinen Carabellischen Höcker; sein Auftreten scheint aber nach den Untersuchungen de Terra's an keine bestimmte Rasse gebunden zu sein. Ob hinsichtlich der Häufigkeit seines Auftretens irgend eine Rasse bevorzugt erscheint, kann erst auf Grund umfangreicher Untersuchungen entschieden werden.

An der Kauflächengestaltung der Molaren sind neben den oben erwähnten Höckern auch sogenannte interstitielle Höcker (Zwischenhöcker) beteiligt, deren Auftreten de Terra bis jetzt als einziger in seine Untersuchungen mit einbezogen hat. Er fand diese Zwischenhöcker am reichlichsten bei negroiden und nicht negroiden Afrikanern, desgleichen bei Australiern und Papua. Auch bei Europäern finden sich interstitielle Höckerchen, wenn auch nicht so zahlreich und häufig wie bei den oben erwähnten Gruppen. Außer den Höckern interessieren auch an der Kauflächengestaltung der Molaren die Schmelzrunzeln, die sich ebenfalls an den Molaren der Anthropoiden finden. Die Schmelzrunzeln der letzteren unterscheiden sich allerdings etwas von denen recenter Menschen dadurch, daß sie nach bestimmten Schemata angeordnet sind, während sie bei recenten Menschenrassen ganz unregelmäßig verlaufen (de Terra 1905). Solche Schmelzrunzeln finden sich nach de Terra am häufigsten bei Dschagga. Abel sowie Proell beobachteten die Schmelzrunzeln häufig bei Buschmännern. Zusammenfassend möchte ich über die Kauflächengestaltung der Molaren sagen, daß man nach den bisher vorliegenden Untersuchungen hier noch nicht von Rassenmerkmalen sprechen kann. Wenn man auch mit Sicherheit annehmen kann, daß die Reduktion der Höckerzahl bei den als großzähmig zu bezeichnenden Rassen nicht so weit vorgeschritten ist als bei den übrigen, und wenn auch einige Rassen sich durch das häufige Auftreten zahlreicher Zwischenhöcker und Schmelzrunzeln auszuzeichnen scheinen, so sind gerade hier noch umfangreiche Untersuchungen erforderlich.

Wenn wir nun noch zum Schluß das Größenverhältnis der drei Molaren zueinander betrachten, so lassen sich hier keine, für irgend eine Rasse charakteristische Beziehungen aufstellen. Nach den bis jetzt vorliegenden Untersuchungen der Terrera's, Shaw's, Abel's und Hrdlicka's ist die totale Volumabnahme von M_1 bis M_3 nicht charakteristisch für die weiße Rasse, da sie sich auch bei allen anderen Rassen in fast gleichem Maße wie bei dieser findet.

Größe und Form der Wurzeln.

Nach dem, was wir bis jetzt über Rassenunterschiede an den Zähnen gehört haben, ist zu erwarten, daß solche auch in der Größe und Form der Wurzeln zum Ausdruck kommen. Über die absolute Länge der Wurzeln bei verschiedenen Rassen liegen bis heute nur die alten Untersuchungen Lambert's (1877) vor. Hiernach sind die Wurzeln bei der gelben Rasse an allen Zähnen durchschnittlich 0,5—1,0 mm länger als bei der weißen Rasse. Durch große Längenmaße zeichnet sich auch die schwarze Rasse aus, vor allem die Australier.

Nach anderen Gesichtspunkten betrachtet Proell (1934) bei seinen Untersuchungen an südwestafrikanischen Eingeborenen die Wurzeln der Zähne, indem er die Wurzellänge mit der Größe der Krone vergleicht. So konnte er feststellen, daß bei diesen Eingeborenen sehr oft die Länge der Frontzahnwurzeln im Verhältnis zur Krone bedeutend geringer ist als bei uns und daß diese Wurzeln oft unterentwickelt sind. Dieses Mißverhältnis, das nach Proell besonders stark an den mittleren Schneidezähnen des Ober- und Unterkiefers der Ovambo zum Ausdruck kommt, ist deshalb so bemerkenswert, weil sich gerade bei diesen Stämmen eine durchschnittliche Überentwicklung der Kiefer beobachten läßt. Wie aus der beiliegenden Abbildung, die ich der Arbeit Proell's entnommen habe, zu ersehen ist, können die Frontzahnwurzeln sogar kürzer sein als die Krone.



Abb. 4

Kleinheit der Wurzeln verschiedener Ovambozähne.

(Nach Proell)

Durch die Tatsache, daß auch die Seitenzähne — außer den Prämolaren — bei gut ausgebildeten Kronen wie die Schneide- und Eckzähne verhältnismäßig kurze Wurzeln haben, widerlegt Proell die Walkhoff'sche Ansicht, nach der die geringe Größe der Wurzeln durch geringe Funktion erklärt wird. Proell (1934) schreibt Seite 84: „Danach haben also merkwürdigerweise gerade diejenigen Zähne, die funktionell am meisten beansprucht werden, die kürzesten Wurzeln. Man könnte annehmen, daß die Funktion die Entwicklung der Kronen begünstigt, die Ausbildung der Wurzeln dagegen hemmt.“ Er vermutet jedoch, daß die Entwicklung der Wurzeln rachitischen oder endokrinen Störungen unterworfen ist.

Hinsichtlich der Form konnte Proell 1934 feststellen, daß den Frontzahnwurzeln der südwestafrikanischen Eingeborenen eine Abknickung in der Sagittalen fehlt, und daß man eher eine Abbiegung des Wurzelendes in frontaler Richtung beobachten kann. Besonders auffallend war das Fehlen der sagittalen Abbiegung an oberen mittleren Schneidezähnen, während sie bei unteren Frontzähnen schwach angedeutet war (Abb. 5).



Abb. 5

Abbiegung der Wurzeln von Frontzähnen.


- a) r. o. 1 von Malayen mit ausgeprägter Wurzelabbiegung in sagittaler Richtung.
- b) l. o. 1 von Bantu ohne Wurzelabbiegung.
- c) u. d) l. u. r. o. 1 von Ambo-Angolagrenze. Wurzelspitzen frontal abgebogen.
- e) r. u. 2 von Ambo mit schwach angedeuteter Wurzelabbiegung in sagittaler Richtung. (Nach Proell.)

Der Taurodontismus.

Bei der Belprechung der Wurzeln möchte ich es nicht verläumen, eine besondere Zahnform zu beichreiben, für die von A. Keith der Ausdruck Taurodontismus geprägt wurde. Wir sind im allgemeinen gewohnt, am Zahn 3 Teile zu unterscheiden:

die Krone — der mit Schmelz bedeckte Teil des Zahnes, die Wurzeln — die mit Zement bedeckten und in der Alveole steckenden Zahnteile und schließlich den Zahnhals — der Teil des Zahnes, der zwischen Krone und Wurzel vermittelt und vielfach durch eine Einschnürung erkenntlich ist. Diese Einteilung läßt sich jedoch nicht auf alle Zahnformen anwenden. So sind bei vielen Molaren des Heidelberger und Neanderthaler Menschen die Wurzeln mehr oder weniger miteinander verwachsen, sodaß man kaum noch von Wurzeln im Sinne unserer Molarenwurzeln sprechen kann. Diese Zähne, bei denen sich auch die Pulpenkammer tief in den in der Alveole steckenden Zahnteil erstreckt, bezeichnet Keith 1913 (zitiert nach Shaw 1927) als taurodonte Zähne und spricht von Taurodontismus, da sie sich in ihrer Form denen bei einigen Wiederkäuern, z. B. beim Ochsen nähern. Solche Molaren, die eine deutliche Aufteilung der Wurzeln zeigen, nennt Keith cynodonte Zähne, da sie nach seiner Ansicht Merkmale aufweisen, wie sie sich an Zähnen von Carnivoren feststellen lassen. Die Molaren der meisten heute lebenden Menschenrassen sind cynodont.

An taurodonten Zähnen ist der nicht zur Krone gehörende und nicht in Wurzeln gegliederte Teil des Zahnes wesentlich größer als bei cynodonten. Shaw (1927) nennt diesen Teil des Zahnes Körper (Abb. 6).



A) Cynodonder Zahn, B) taurodonder Zahn
(Nach Shaw)

Das Hauptmerkmal eines taurodonten Zahnes ist also die mehr oder weniger große Ausdehnung des ungegliederten, nicht zur Krone gehörenden Zahnteiles (Körper) auf Kosten der Wur-

zeln; hierzu kommt vielfach noch die Ausdehnung der Pulpenkammer auf den infraalveolaren Teil des Zahnes.

Shaw (1927) fand taurodonte Zähne auch an den Schädeln der ausgestorbenen südafrikanischen Strandlöfferrasse, bei deren Mitgliedern es sich um Buschmann-Boskop-Bastarde handelt (siehe Abb. 8). Da der Taurodontismus hier nicht so stark ausgeprägt war wie bei den oben erwähnten fossilen Rassen, so schuf Shaw eine Einteilung, um den Entwicklungsgrad des Taurodontismus auszudrücken. Von den Molaren des Heidelberger, die er mesotaurodont nennt, als Norm ausgehend, bezeichnet er die Krapina-Molaren als hypertaurodont und die der südafrikanischen Bastarde als hypotaurodont (Abb. 7).




Abb. 7 (nach Shaw)

Durch die oben erwähnte Beobachtung veranlaßt, versuchte Shaw festzustellen, ob auch an lebenden südafrikanischen Völkern taurodonte Zähne vorkommen. Hierbei machte er die Feststellung, daß bei reinen Bantu und reinen Buschmännern keine taurodonten Zähne zu finden waren, sondern daß diese nur Molaren vom cynodonten Typ aufwiesen. Dagegen fand er bei Bantu- oder Buschmann-Bastarden mit boskopoiden oder australoiden Elementen in 30% der untersuchten Fälle taurodonte Zähne (siehe Abb. 8). Hieraus schließt Shaw, daß der Taurodontismus ein Merkmal der boskopoiden und australoiden Völker Südafrikas war und sich in rezessivem Erbgang nach Mendel vererbt.




Abb. 8

- A) Strandläufer-Molaren. Unterer zweiter Molar, oberer zweiter Molar, oberer erster Molar, oberer zweiter Molar, oberer erster Molar, oberer erster Molar.
- B) Boskop-Molaren. Unterer zweiter Molar, unterer erster Molar, oberer zweiter Molar, oberer erster Molar.
- C) Zähne von Bantu-Boskop-Bastarden. Unterer erster Molar, oberer zweiter Molar, oberer dritter Molar, oberer erster Prämolare.

Entwicklung und Durchbruch der Zähne.

Die Rassenunterschiede bei Zähnen beschränken sich nicht allein auf ihren morphologischen Bau, sondern scheinen auch in ihrer Entwicklung, ihrer Durchbruchfolge und im Zeitpunkt ihres Durchbruchs zum Ausdruck zu kommen.

So weist Proell (1927) darauf hin, daß bei zivilisierten Rassen die Haupttätigkeit der Kiefer nur in schwach angedeuteten Mahlbewegungen besteht, bei Naturvölkern dagegen das Kiefergelenk zu umfangreicheren dreidimensionalen Kaubewegungen befähigt ist. Als Folge dieser geringen funktionellen Beanspruchung zeigt sich in der Entwicklungsperiode der Kiefer bei zivilisierten Rassen eine ungenügende Durchblutung des Knochens und eine Entwicklungsbehinderung der Keimanlagen bleibender Zähne im raumbeengten Kiefer zwischen gekrümmten Wurzeln der Milchzähne.



Abb. 9

Entwicklungsbehinderung der bleibenden Zahnanlage zwischen gekrümmten Milchzahnwurzeln bei zivilisierten Europiden nach Zahnschnittbild von O. Römer, Leipzig. (Proell 1937.)

Was die Durchbruchfolge der einzelnen Zähne des Dauergebisses betrifft, so liegen die Verhältnisse bei den Europäern bekanntlich so, daß der Durchbruch des Ersatzgebisses vor oder zu gleicher Zeit mit dem Durchbruch des ersten Dauermolaren beginnt. Bei den anderen bis jetzt in dieser Hinsicht untersuchten Rassen soll der Zahnwechsel dagegen erst nach dem Durchbruch des ersten Dauermolaren beginnen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung *Bea n's* (zitiert nach *Abel* 1933), daß die Durchbruchfolge des in Amerika geborenen Europäers sich ändern soll. Um die Durchbruchfolge der bleibenden Zähne verschiedener Rassen zu zeigen, habe ich der Arbeit *Proell's* (1937) untenstehende Abbildung entnommen.

Aus dem Schema kann man ersehen, daß die Reihenfolge des Ersatzes bei Buschmännern, Hottentotten und Negern große Ähnlichkeit mit der bei Zulu und weißen Amerikanern zeigt. Gänzlich verschieden hierzu ist die Durchbruchfolge bei Philippinen, die im Oberkiefer am deutlichsten zum Ausdruck kommt: Bei den oben erwähnten Gruppen tritt der Eckzahn in der Durchbruchfolge als fünfter Zahn in den Kiefer, bei den Philippinen dagegen als zweiter. Auch beginnt nach *Bea n's* Untersuchungen der Zahnwechsel bei Philippinen wesentlich früher als bei anderen Rassen.




Abb. 10

Vergleich des Zahndurchbruch bei

- A) Südatrikanern (Buschmänner, Hottentotten und Neger).
- B) Zulu (nach Suk).
- C) Europäern in Amerika (nach Bean).
- D) Europäern (deutsche) (nach Bean).
- E) Philippinen (nach Bean).

(Nach W. Abel, 1933.)

Die Durchbruchfolge ist durch die Verbindungslinien der einzelnen Zähne, mit J₁ beginnend, zu erkennen.

Bei seinen Untersuchungen an Bantukindern in Johannesburg stellt Proell (1934) fest, daß bei ihnen die Milchzähne durchschnittlich später durchbrechen als bei weißen Kindern in Europa. Dagegen findet der Durchbruch der bleibenden Zähne bei afrikanischen Negerkindern früher statt als bei uns. Die beiden Dentitionen sind also zeitlich einander näher gerückt. Es beginnt nach

Proell's Untersuchungen an Batukindern die erste Dentition mit dem 9. Monat und die zweite mit dem 4. bis 5. Lebensjahr. Hierbei kann die Gebißentwicklung bereits in der Mitte des zweiten Jahrzehnts beendet sein. Proell widerlegt hiermit die von R ö s e indirekt aufgestellte Behauptung, daß bei der armen Bevölkerung die zweite Dentition später einsetzt als bei Reichen. Gegen die Annahme, daß das frühe Einsetzen der zweiten Dentition bei Bantu eine pithekoide Eigenschaft sein könnte, spricht nach Proell die Tatsache, daß er bei der noch primitiveren Koin-Koin-Rasse eine ausgesprochene Verzögerung der zweiten Dentition feststellte. Diese Tatsache deutet ferner darauf hin, daß hier weniger Umwelteinflüsse als vielmehr rassegebundene Eigenheiten für das zeitlich verschiedene Eintreten der beiden Dentitionen verantwortlich zu machen sind.

Zusammenfassung.

Auf Grund bereits vorliegender Messungen und Untersuchungen sollte festgestellt werden, welche Rassenunterschiede und Rassenmerkmale sich an den Zähnen recenter Menichenrassen nachweisen lassen.

Hinsichtlich der Zahngröße ist zu sagen, daß sich bei den einzelnen Rassen mehr oder weniger große Unterschiede nachweisen lassen. Das Merkmal „Großzähmig“ kommt den Timorese, Australiern, Melanesiern und Dschagga, das Merkmal „Kleinzähmig“ den Birmanen, Feuerländern und Buschmännern zu. Die Molaren der Feuerländer und Buschmänner ähneln jedoch in ihren Maßen denen der Europäer, die wie die Bantu und Hottentotten ungefähr in der Mitte der beiden obigen Gruppen stehen.

Der Dental-Index zeigte erneut seine Unzulänglichkeit zur Bestimmung der Zahngröße als Rassenmerkmal.

Die Untersuchungen A z o u l a y's und R e g n a u l t's (1893) deuten darauf hin, daß die Seitenwände der oberen Schneidezähne bei Australiern, Negern und Papua zur Schneidekante hin stark divergieren, während sie bei der gelben Rasse, sowie bei den Europäern und Hindu zur Schneidekante hin mehr parallel werden. Die Banturassen scheinen nach den Untersuchungen S h a w's in dieser Beziehung eine Ausnahme innerhalb der Negerrassen zu bilden, da von Shaws Untersuchungsmaterial 50% fast parallele Seitenwände hatten.

Die Völker der gelbbraunen Rasse zeichnen sich durch schäufelförmige Schneidezähne aus, die sich bei anderen Rassengruppen Negern und Weißen, nur sehr selten finden und die man daher als Merkmal der gelbbraunen Rasse ansprechen kann.

Durch Vergleich der Maße de Terras, Shaws und Abels konnte gezeigt werden, daß die Ansicht de Terras, nach welcher die Breitendifferenz zwischen J₁ und J₂ sup. bei unkultivierten Völkern größer sei als bei kultivierten, hinfällig geworden ist. Vielmehr deutete der Vergleich darauf hin, daß die Breitendifferenz bei großzähligen

Gruppen bzw. Rassen groß und bei kleinzahnigen klein zu fein schein.

An den unteren Schneidezähnen ließen sich außer den Differenzen in den absoluten Dimensionen keine weiteren Rassenunterschiede feststellen. Die Seitenwände der Eckzähne sind nach Regnaults Untersuchungen bei niederen Rassen, Negern und Australiern, zur Kaukante hin stärker divergierend als bei Europäern. Für die oft geäußerte Ansicht, der Eckzahn bei niederen Rassen sei im Verhältnis zu den anderen Zähnen größer als bei höheren, ließen sich keine Anhaltspunkte finden.

Bezüglich der Prämolarenform war für keine Rasse oder Gruppe eine typische Form festzustellen. Die Prämolarenkaufläche ist nach de Terra bei Australiern durch zahlreiche interstitielle Höcker ausgezeichnet.

Die Approximalwände der Molaren divergieren nach Regnaults (1894) Untersuchungen bei Australiern und Negern viel stärker zur Kaukante hin als bei Weißen. Die unteren Molaren der Neger und Eskimo sind nach der Bestimmung des Kronen-Index durch Hrdlicka (1923) im Verhältnis zur Breite dicker als bei Weißen.

Bezüglich der Höckerzahl der Molaren wurde festgestellt, daß die als großzählig bezeichneten Rassen bzw. Gruppen eine geringere Reduktion der Höckerzahl aufweisen als die übrigen.

Das Carabellische Höckerchen ist kein Rassenmerkmal.

Die Molaren der Australier und Papua sowie der negroiden und nicht negroiden Afrikaner sind nach den Untersuchungen de Terras (1905) durch das Auftreten interstitieller Höcker ausgezeichnet.

Schmelzrunzeln finden sich nach de Terra (1905) häufig bei Dschagga, Abel sowie Proell beobachteten Schmelzrunzeln auch häufig bei Buschmännern.

Die Volumzu- oder Abnahme innerhalb der Molarenreihe ist für keine der bis jetzt untersuchten Rassen bzw. Gruppen charakteristisch.

In der Größe und Form der Wurzeln finden sich ebenfalls nach Proells Untersuchungen an südafrikanischen Eingeborenen bedeutende Rassenunterschiede gegenüber europäischen Rassen.

Die Zähne der meisten heutigen Rassen sind nach Keith's Einteilung cynodont. Taurodonte Zähne fand Shaw 1927 an Bantu- oder Buschmann-Bastarden mit boskopoiden oder australoiden Elementen.

Im Zahndurchbruch zeigen sich nach Proells, Beans und Abels Untersuchungen ebenfalls Unterschiede zwischen einzelnen Rassen.

Ich möchte es nicht veräumen, Herrn Professor Dr. Proell für die Überlassung des interessanten Themas sowie für die gütige Unterstützung bei der Bearbeitung desselben an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen.

Literaturverzeichnis.

- Abel, W. (1933): Zähne und Kiefer in ihren Wechselbeziehungen bei Buschmännern, Hottentotten, Negern und deren Bastarden.
Zeitschr. f. Morph. u. Anthropol. Bd. 31, S. 314
- Adloff, P. (1908): Das Gebiß des Menschen u. der Anthropomorphen.
Berlin 1908.
- (1936) Art- u. Rassenmerkmale im Gebiß des fossilen Menschen.
Sonderabdr. aus Zeitschr. f. Rassenkunde 1936. Bd. III, H. 1.
- Azoulay u. Regnault (1893): Des diverses formes des dents incisives supérieures.
Bull. de la société d'anthropologie de Paris. S. 266.
- Flower, H. W. (1885): On the size of the teeth as a character of race.
Journ. of the anthrop. institute of Great Britain and Ireland.
Bd. 14, S. 183.
- Gregory, W. K. (1921): The origine and evolution of the human dentition.
The Journ. of Dental Research. S. 87.
- Hrdlicka, A. (1921): Further studies of tooth morphologie.
American Journal of physical Anthropology. S. 141.
- (1923) Variations in the demensions of lower molars in man and anthropoid apes.
Americ. Journal of physical Anthropology. S. 423.
- Lambert (1877): Morphologie du système dentaire des races humaines.
Bull. de l'académie royale des sciences de Belgique. S. 559.
- Martin, R. (1928): Lehrbuch der Anthropologie. Jena.
- Miklucho-Malclay, v. (1876): Über die großzahnigen Melanesier.
Verhandlungsbericht d. Berl. Gefellsch. f. Anthropol., Ethnol. und Urgeschichte. S. 290.
- Montelius, G. A. (1933): Observations on teeth of Chinese.
Journ. of Dental Research. S. 501.
- Proell, F. W. (1934): Klima und Zivilisation in ihrer Auswirkung auf Körper und Zähne. Berlin.
- (1937): Rasse und Zahnleiden.
Sonderabdruck aus „Rasse u. Krankheit“ (Schottky), München.
- Regnault, T. (1894): Des malformations dentaires chez le signe.
Comptes rend. de la Société de biologie. S. 1931.
- Roepstorff, de (1881): Auffällig große Zähne der Nikobaren. Verhandlungsbericht der Berlin. Gef. f. Anthropol., Ethnol. und Urgeschichte. S. 218.

- Schaa f ha u f e n (1883): Über Zähne bei Schädelmessungen.
Korresp. Blt. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthr., Ethnol. und Ur-
geschichte.
- S h a w (1927/28): Taurodont teeth in South African races.
Journal of Anatomie, S. 476.
- (1931) The teeth, the bony palate and the mandible in Bantu
races of South Africa. London 1931.
- T e r r a , de M. (1905): Beiträge zu einer Odontographie der Menschen-
rassen.
Diff. Zürich.
- Weinert, H. (1935): Die Rassen der Menschheit. Leipzig.
- Williams, J. L. (1914): A new classification of human tooth forms;
with spezial reference to a new system of artificial teeth.
Dental digest. S. 63.
-

Lebenslauf.

Am 4. Oktober 1904 bin ich als Sohn des verstorbenen Haupt-
lehrers Wilhelm Eifel und seiner Ehefrau Margareta, geb. Schares
in Großlittgen (Kr. Wittlich) geboren. Dortselbst besuchte ich die
Volkschule bis Ostern 1916 und daran anschließend das Gymna-
sium zu Prüm (Eifel). Die Reifeprüfung bestand ich im Herbst 1925
an der Landesstudienanstalt zu Merzig (Saar). Anschließend studierte
ich Naturwissenschaften (Biologie und Chemie) in Freiburg i. B.
und Bonn am Rhein bis Sommersemester 1931. Dann war ich drei
Semester beurlaubt und begann das zahnärztliche Studium im Som-
mersemester 1933 in Bonn, wo ich Herbst 1934 die zahnärztliche
Vorprüfung bestand. Das zahnärztliche Staatsexamen legte ich eben-
falls in Bonn im Frühjahr 1936 ab. Die Approbation als Zahnarzt
erhielt ich am 26. Mai 1936.

